

HSU/ Undersøgelse af passageforhold i æggelederne

Revideret November 2020

Formålet med HSU er, at undersøge passagen i dine æggeledere inden fertilitetsbehandling. Undersøgelsen foretages på 6-10. menstruationsdag. Du skal derfor ringe til klinikken på din 1. menstruationsdag (eller dagene derefter), så der kan aftales en tid.

Undersøgelsen HSU er en ultralydsundersøgelse, hvor der føres et tyndt blødt kateter gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. Samtidigt med, at du bliver ultralydsskannet, sprøjtes sterilt væske/ gél igennem kateteret. Væsken vil nu løbe igennem æggelederne, såfremt der er passage. Gennemskyllningen varer ca. 5 minutter og kan være forbundet med menstruationslignende smerter. Du kan opleve lidt vandigt evt blodigt udflåd i timerne efter. Du tilrådes at tage tbl. Paracetamol 1g ca. én time før indgrebet.

Smerter og ubehag

Der kan forekomme lette smerter i maven og evt skulderen efterfølgende. Smerterne forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer.

Risici

Der er en lille risiko for infektion, men dette skønnes at være under 1%. Vedvarer smerterne eller tilkommer der feber og/ eller tiltagende blødning, skal du kontakte klinikken. Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes egen læge eller vagtlæge.

Svar på undersøgelsen

Du får i forbindelse med HSU på klinikken resultatet at vide umiddelbart efter undersøgelsen.